

## VÉLEMÉNYEZÉS

### MUSKELaktiv

---

**Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet, Lenti  
Bacsa Józsefné:**

**P1:**

- Acut gerincbántalom:
- Sérv
- Lumboischialgia
- Spondilosis okozta fájdalmak

Már az első kezelés után csökkent a fájdalom az izomzat lazult.

**P2:**

- Coxarthrosis
- Gonarthrosis
- Chr. Gerincbántalmak.

Fájdalom csökkent.

**P3:**

- Keresztszalagsérülés
- Porcsérülést követő műtét utáni rehabilitáció részeként használtam.

Jó kontrakciót hoz létre az izomzaton, nem fárasztja az izmot, a kezelés teljes ideje alatt egyforma kontrakciót hoz létre.

**P4:**

- Rotátorköpeny sérülés
- Vállficam után
- Felkarcsonttörés után rehabilitáció, izomerősítés kiegészítéseként alkalmaztam.

Ép beidegzésnél, sorvadtt izmoknál jó izommozgást hoz létre.

**P5:** A térd – lábszársérülések későbbi rehabilitációs szakaszában izomedzésekre alkalmaztam.

**P6:** Vállficam későbbi rehabilitációnál izomedzés részeként, ujj- csuklósérülés után az alkar

-thenar -hypothernar izomzat edzésére használtam.

Izomerő-növekedés gyorsabb ütemű volt, mint azoknál a betegeknél, ahol nem alkalmaztam semmiféle stimulálást.

Bacsa Józsefné

Lenti, Dr-Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet”